

GRAZIE AL TUO IMPEGNO **LE** **LORO STORIE** CONTINUANO



Studio SAFIR: tasso di sanguinamenti più basso con XARELTO® vs AVK negli anziani over 80 con FA²

I pazienti con FA over 80 anni hanno un rischio 3 volte maggiore di incidenza di sanguinamenti maggiori³

Xarelto ha evidenziato il tasso di sanguinamento più basso[†]

**Sanguinamento maggiore:
XARELTO® vs AVK**

**47%
RRR***

HR: 0,53
IC 95%: 0,33-0,85
p<0,01

**Emorragia intracranica:
XARELTO® vs AVK**

**74%
RRR***

HR: 0,26
IC 95%: 0,09-0,80
p<0,05

Tabella Integrale

‡rispetto ai pazienti ≤ 80 anni

†verso AVK

*RRR: Riduzione del Rischio Relativo, calcolato come 1-HR Campione ottenuto con propensity score: calcolato sulle caratteristiche significativamente differenti riguardo gli eventi emorragici.

AVK: antagonisti della vitamina K; **FA:** fibrillazione atriale; **HR:** hazard ratio; **IC:** intervallo di confidenza; **RRR:** riduzione del rischio relativo.

1. Bayer AG. IQVIA MIDAS, Database Quaterly Sales Q2 2022. Bayer estimate based on calculations on IQVIA data. 2022

2. Hanon O et al. Heart. 2021;107(17):1376-1382.

3. Hylek EM et al. Circulation. 2007;29;115:2689-2696.