

XARELTO® Indicazioni principali e dosaggi

Fibrillazione Atriale¹



Xarelto® è indicato in:

Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio.

Dosaggio:

20mg
una volta
al giorno

15mg
una volta
al giorno

Nei pazienti con insufficienza renale

Insufficienza renale moderata (ClCr 30-49 ml/min)

Insufficienza renale grave (ClCr 15-29 ml/min)
(usare con cautela)

Tromboembolismo venoso adulti¹



Xarelto® è indicato per:

Trattamento e prevenzione delle recidive di trombosi venosa profonda (TVP) ed embolia polmonare (EP) nell'adulto.

Dosaggio:

dal Giorno 1 al 21

15mg BID

Da diagnosi di
TVP o EP

dal Giorno 22

20mg OD

dopo 6 mesi

10mg OD o

In caso di rischio elevato
di recidiva di TEV:

- Comorbidità complicate
- Recidiva di EP o TVP durante
la profilassi di lunga durata

20mg OD

Tromboembolismo venoso popolazione pediatrica¹

Xarelto® è indicato per:

Trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei neonati a termine, nei lattanti, nei bambini piccoli, nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni dopo almeno 5 giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale.

Nei pazienti pediatrici la dose di Xarelto® e la frequenza di somministrazione sono determinate in base al peso corporeo*

*§ RCP di Xarelto® compresse da 15mg e 20mg e granuli per sospensione orale.



Coronaropatia o arteriopatia periferica sintomatica¹



Xarelto® è indicato per:

Prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (coronary artery disease, CAD) o arteriopatia periferica (peripheral artery disease, PAD) sintomatica, somministrato insieme con acido acetilsalicilico (acetylsalicylic acid, ASA).

Dosaggio:

ASA
100mg OD



2,5mg
due volte
al giorno



XARELTO® a dose vascolare
2,5mg BID

Dual Pathway Inhibition



XARELTO® 2,5mg e 10mg può essere assunto indipendentemente dal cibo
XARELTO® 15mg e 20mg deve essere assunto con il cibo

OD: una volta al giorno; **BID:** due volte al giorno; **ClCr:** Clearance della creatinina



Inquadra il QR code per accedere a RCP XARELTO®

BIBLIOGRAFIA 1.XARELTO® (rivaroxaban). RCP; **2.** Bayer AG. IQVIA MIDAS, Database Quarterly Sales Q2 2022. Bayer estimate based on calculations on IQVIA data. 2022

XARELTO® 20mg 28 cpr CLASSE A (97) -PHT-RR €96,76 - XARELTO® 15mg 42 cpr CLASSE A (97) -PHT-RR €145,13 -XARELTO® 10 mg 30 cpr CLASSE A-RRL € 103,67 - XARELTO® 10 mg 10 cpr CLASSE A-RRL € 34,56 - XARELTO® 2,5 mg 56 cpr CLASSE A-RRL € 96,76

Depositato presso AIFA in data XX/XX/XXXX PP-XAR-IT-XXXX-X

PAZIENTI TRATTATI NEL MONDO
110
MILIONI
IN TUTTE LE INDICAZIONI

 **Xarelto®**
rivaroxaban

